

Schilddrüsenknoten: Ultraschallkontrollen und Indikationen zur Feinnadelaspiration

TIRADS Score	Dignität	Befunde, Kriterien		Grösse < 1 cm	Grösse 1 - 2 cm	Grösse > 2cm oder Wachstum
2	benigne	<ul style="list-style-type: none">• banale Zyste• spongiformer Knoten• "weisser Ritter"• isolierte Makroverkalkung• noduläre Hyperplasie, "Kropf"		-		
3	sehr wahrscheinlich benigne	<ul style="list-style-type: none">• Regelmässige Form und Begrenzung• Hyperechogen oder isoechogen• keine Mikroverkalkungen• Gefässhalo		US- Kontrolle (12 - 48 Mte.)		FNA
4 a	leicht suspekt	<ul style="list-style-type: none">• leicht hypoechogen• keine der nachfolgenden Kriterien		US- Kontrolle (6 - 12 Mte.)	FNA oder US- Kontrolle (6 - 12 Mte.)	
4b	suspekt	1- 2 folgender Kriterien:	<ul style="list-style-type: none">• Taller than Wide ("Rübe")• unregelmässige Begrenzung• Mikrokalzifikationen• hypoechogen• hart (Elastografie)	kapselnah oder im Oberpol: FNA	FNA	
5	hochgradig suspekt	3- 5 folgender Kriterien:		übrige: US- Kontrolle (3 - 6 Mte.)		